



EMERALD FUNGICIDA ANTIOIDIO

(Nº Registro: 23.636)

60074-60130-60096



FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

EMERALD FUNGICIDA ANTIOIDIO es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, de amplio espectro, a base de *tetraconazol*. De alta efectividad y buena persistencia (resistente a la lluvia), se emplea en el control de enfermedades producidas por hongos en cultivos y plantas ornamentales, en particular en el rosal.

Autorizado Uso Domestico – JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

COMPOSICIÓN

Tetraconazol, 10% p/v

PRESENTACIÓN

Emulsión concentrada (EC)

Se presenta en:
Botella de 10 ml.

PRINCIPALES APLICACIONES

EMERALD FUNGICIDA ANTIOIDIO se emplea en el control de las principales enfermedades causadas por hongos en el rosal: antracnosis (mancha negra), roya, oídio.



Mancha negra



Roya



Oídio

También puede aplicarse en diferentes cultivos (frutales de pepita, frutales de hueso, hortalizas (cucurbitáceas, alcachofa, fresales, tomate...), vid para el control de enfermedades como oídio, moteado.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Aplicar en **pulverización foliar normal**, a la dosis de 0.025-0.05%, es decir, **1.0 ml por cada 1-2 litros de agua**.

Tratar de forma preventiva, una vez al mes en primavera. Si las condiciones climáticas (humedad) son favorables al desarrollo de enfermedades o al detectarse los primeros síntomas, tratar cada 12-14 días. Emplear la dosis más alta en caso de tratamientos curativos.

Mojar bien toda la planta. Efectuar el tratamiento a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor insolación.

OBSERVACIONES

EMERALD FUNGICIDA ANTIOIDIO se trata de un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores y/o aerosoles. Evítese el contacto con los ojos. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de ingestión **NO PROVOCAR EL VÓMITO**: acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE LA ETIQUETA).